

Fundliste der MAMU-Pilzwanderung vom 13.08.2005 in D - BY - RO - Feldkirchen-W. - Riedholz,
 MTB 8037/3/3/1, 570 m - 640 m über N.N., Fi mit eingestr. Bu, Ta, Bi, Erl, Berg-Ah, Berg-UI, Ei,
 Sal-Wei, Esch, Kie, Kir. Boden sauer, sumpfige, lehmige Stellen, leicht hügelig, nass. Wetter
 stark bewölkt, Regenschauer, kühl, Temperatur ca. 15 Grad. Teilnehmer: 7, Führung: Robert Tardino.

| Nr. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Speisewert | Fundort | Exs. |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|
| 1. | Agaricus lutosus | Ockerfarbener Zwerg-Egerling | essbar | im Maisfeld auf nackter Erde | |
| 2. | Amanita fulva | Rotbrauner Streifling | essbar | bei Fi, Bi auf Nadelstreu | |
| 3. | Amanita muscaria | Fliegenpilz | giftig | bei Fi, Bi, Bu auf Streu | |
| 4. | Amanita porphyria | Porphyrbrauner Wulstling | giftig | bei Fi auf Nadelstreu | |
| 5. | Amanita rubescens | Perlpilz | essbar | bei Fi in Nadelstreu | |
| 6. | Amanita vaginata | Grauer Streifling | essbar | bei Fi, Bi auf Nadelstreu | |
| 7. | Amylostereum areolatum | Braunfilziger Fichten-Schichtpilz | ungeniessbar | an liegendem Fi-stamm | Verein |
| 8. | Ascocoryne sarcoides | Fleischroter Gallertbecher | ungeniessbar | an Laubholzstumpf, mit Konidien | |
| 9. | Bisporella citrina | Zitronengelbes Holzbecherchen | ungeniessbar | an bemoostem Laubholzstamm | |
| 10. | Calocera viscosa | Klebriger Hörnling | ungeniessbar | an morschem Fi-Stumpf | |
| 11. | Ceratiomyxa fruticulosa | Schleimpilz | ungeniessbar | an Eschenast | |
| 12. | Chalciporus piperatus | Pfeffer-Röhrling | ungeniessbar | bei Fi, Bi, Bu auf Streu | |
| 13. | Clitocybe gibba | Ockerbrauner Trichterling | ungeniessbar | bei Bu, Esche auf Laubsrtreu | |
| 14. | Cortinarius croceus | Safranblättriger Hautkopf | giftig | bei Fi im Moos, Nadelstreu | |
| 15. | Cortinarius cruentus | Rotbrauner Hautkopf | giftig | bei Fi auf Nadelstreu | Verein |
| 16. | Cortinarius sanguineus | Blutroter Hautkopf | giftig | bei Fi im Moos, Nadelstreu | Verein |
| 17. | Cortinarius variegator | Erdgriechender Schleimkopf | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu | |
| 18. | Cortinarius violaceus | Dunkelvioletter Schleierling | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu | |
| 19. | Cystolepiota seminuda | Behangener Mehlschirmling | ungeniessbar | bei Fi, Bi auf Streu | |
| 20. | Datronia mollis | Grossporige Datronie | ungeniessbar | an bemoostem Laubholzstamm | Verein |
| 21. | Diatrype stigma | Flächiges Eckenscheibchen | ungeniessbar | an Birkenast | |
| 22. | Echinoderma asperum | Spitzschuppiger Stachelschirmling | giftig | an Wegrand | |
| 23. | Entoloma undatum | Dunkelblättriger Nabel-Rötling | ungeniessbar | an bemoostem Baumstumpf | Verein |
| 24. | Exidia pithya | Teerflecken-Drüsling | ungeniessbar | an berindeter, liegender Fi | |
| 25. | Fomes fomentarius | Zunderschwamm | ungeniessbar | an morschem Baumstamm | |
| 26. | Fomitopsis pinicola | Rotrandiger Baumschwamm | ungeniessbar | an liegendem Fi-stamm | |
| 27. | Fuligo septica | Gelbe Lohblüte (Schleimpilz) | ungeniessbar | an Fichtenast | |
| 28. | Ganoderma lipsiense | Flacher Lackporling | ungeniessbar | an Buchenstumpf | |
| 29. | Gloeophyllum sepiarium | Zaun-Blättling | ungeniessbar | an Fi-Ast | |
| 30. | Gloeophyllum trabeum | Balken-Blättling | ungeniessbar | an unberindetem Fi-Stamm | |
| 31. | Gymnopus confluens | Knopfstieliger Rübbling | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu | |
| 32. | Helvella lacunosa | Gruben-Lorchel | ungeniessbar | im Gras an Kalkschotterweg | |
| 33. | Helvella macropus | Graue Langfuss-Lorchel | ungeniessbar | an morschem Baumstumpf | |
| 34. | Hemimycena cucullata | Gipsweisser Scheinhelmling | ungeniessbar | an Buchenästchen | |
| 35. | Heterobasidion annosum | Wurzelschwamm | ungeniessbar | an morschem Fi-Stamm | |
| 36. | Hygrocybe conica | Kegeliger Saftling | giftig | in Kulturrasen | Verein |
| 37. | Hygrocybe tristis | Schwärzender Orange-Saftling | giftig | bei Fi, Bu an Wegrand, Lichtung | Verein |
| 38. | Hyphoderma radula | Reibeisen-Rindenpilz | ungeniessbar | an Ast von Vogel-Kirsche | |
| 39. | Hypholoma fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf | giftig | an Fi-Stumpf | |
| 40. | Hypomyces chrysospermus | Röhrlings-Goldschimmel | giftig | auf Röhrling, verm. Ziegenlippe | |
| 41. | Hypoxyton deustum | Brandkrusten-Kohlenbeere | ungeniessbar | an Buchenstumpf | |
| 42. | Inocybe asterospora | Sternsporiger Risspilz | giftig | bei Fi, Bu, Bi auf Streu | |
| 43. | Inocybe leioccephala | Braungebuckelter Risspilz | giftig | bei Fi auf Nadelstreu | |
| 44. | Inocybe rimosa | Kegeliger Risspilz | giftig | bei Fi auf Nadelstreu | |
| 45. | Kuehneromyces mutabilis | Stockschwämmchen | essbar | an Birkenast | |
| 46. | Laccaria amethystina | Violetter Lacktrichterling | essbar | auf Laubstreu an Wegrand | |
| 47. | Lactarius camphoratus | Kampfer-Milchling | essbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu | |
| 48. | Lactarius fluens | Braunfleckender Milchling | ungeniessbar | bei Bu, Esche, Fi, Ei | |
| 49. | Lactarius tabidus | Flatter-Milchling | ungeniessbar | bei Fi, Bi im nassen Moos | |
| 50. | Leccinum scabrum | Birkenpilz | essbar | bei Bi, Fi, Bu | |
| 51. | Leotia lubrica | Gallertkämpchen | giftig | bei Fi im nassen Moos | |
| 52. | Lepiota clypeolaria | Wollstiel-Schirmling | ungeniessbar | auf Buchenstreu | |
| 53. | Lepiota cristata | Stink-Schirmling | ungeniessbar | an Wegrand im Gras | |
| 54. | Leucopaxillus candidus | Weisser Krempentrichterling | essbar | bei Fi, Bu, Bi, Esche auf Streu | |
| 55. | Lycoperdon umbrinum | Brauner Stäubling | essbar | auf Nadelstreu | |
| 56. | Marasmius alliaceus | Langstieliger Knoblauch-Schwindling | essbar | auf Buchenstreu | |
| 57. | Marasmius bulliardii | Käsepilzchen | ungeniessbar | auf Streu, verrottetem Holz | |
| 58. | Marasmius cohaerens | Hornstiel-Schwindling | ungeniessbar | im Gras an Kalkschotterweg | |
| 59. | Marasmius oreades | Feld-Schwindling | essbar | 5 Hexenringe in Kulturrasen | |
| 60. | Marasmius torquescens | Filzstieliger Schwindling | ungeniessbar | bei Bu, Esche auf Laubsrtreu | |
| 61. | Marasmius wynnei | Violettlicher Schwindling | ungeniessbar | bei Esche, Bu, Fi auf Streu | |
| 62. | Megacollybia platyphylla | Breitblättriger Rübbling | ungeniessbar | an morschem Holz | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| 63. <i>Melanoleuca melaleuca</i> | Gemeiner Weichritterling | essbar | bei Bu, Fi, Esche auf Laubstreu |
| 64. <i>Meruliopsis corium</i> | Häutiger Lederfältling | ungeniessbar | an Laubholzästchen |
| 65. <i>Mycena haematopus</i> | Grosser Blut-Helmling | ungeniessbar | an Laubholzstamm |
| 66. <i>Mycena pelianthina</i> | Schwarzgezähnelter Rettich-Helmling | giftig | bei Fi, Bu, Esch auf Laubstreu |
| 67. <i>Mycena pura</i> | Rettich-Helmling | giftig | bei Fi, Bu, Esch, B-Ah auf Streu |
| 68. <i>Mycena zephrus</i> | Rostfleckiger Helmling | ungeniessbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu |
| 69. <i>Nectria cinnabarina</i> | Zinnoberroter Pustelpilz | ungeniessbar | an Birkenreisig |
| 70. <i>Peziza badia</i> | Kastanienbrauner Becherling | ungeniessbar | bei Fi, Bi auf sandigem Boden |
| 71. <i>Phaeohelotium umbilicatum</i> | Weisssporiger Nabelbecherling | ungeniessbar | an bemoostem Baumstumpf |
| 72. <i>Phallus impudicus</i> | Stinkmorchel | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu |
| 73. <i>Phellinus ferruginosus</i> | Rostbrauner Feuerschwamm | ungeniessbar | an liegendem Laubholzast |
| 74. <i>Phragmotrichum chaillatii</i> | kein deutscher Name | ungeniessbar | an Fi-Zapfen am Boden |
| 75. <i>Pluteus atomarginatus</i> | Schwarzschneidiger Dachpilz | essbar | an morschem Fichtenstumpf |
| 76. <i>Psathyrella candolleana</i> | Behangener Faserling | ungeniessbar | büschelig an vergrabenem Holz |
| 77. <i>Pseudonectria tilachlidii</i> | Schlauchpilz (Konidienstadium) | ungeniessbar | Parasit an faulendem Blätterpilz Beenk. |
| 78. <i>Puccineastrum areolatum</i> | Fichtenzapfen-Schwarzrost | ungeniessbar | an Fi-Zapfen am Boden |
| 79. <i>Ramaria flaccida</i> | Flatterige Fichten-Koralle | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu |
| 80. <i>Rhytisma acerinum</i> | Ahorn-Runzelschorf | ungeniessbar | Parasit an Berg-Ahornblatt |
| 81. <i>Russula betularum</i> | Birken-Spei-Täubling | giftig | bei Fi, Bi auf Nadelstreu |
| 82. <i>Russula chloroides</i> | Schmalblättriger Weiss-Täubling | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu |
| 83. <i>Russula cyanoxantha</i> | Frauen-Täubling | essbar | bei Fi, Ta auf Nadelstreu |
| 84. <i>Russula densifolia</i> | Dichtblättriger Schwärz-Täubling | ungeniessbar | bei Fi, Bu in Nadelstreu |
| 85. <i>Russula nigricans</i> | Dickblättriger Schwärz-Täubling | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu |
| 86. <i>Russula ochroleuca</i> | Ocker-Täubling | ungeniessbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu |
| 87. <i>Russula queletii</i> | Stachelbeer-Täubling | ungeniessbar | bei Fi, Bi, Bu auf Streu |
| 88. <i>Russula vesca</i> | Fleischroter Speise-Täubling | essbar | bei Fi an Wegrand |
| 89. <i>Russula viscida</i> | Lederstiel-Täubling | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu |
| 90. <i>Schizophyllum comune</i> | Spaltblättling | ungeniessbar | an Buchenast |
| 91. <i>Stereum subtomentosum</i> | Samtiger Schichtpilz | ungeniessbar | an liegender Bi, Bu |
| 92. <i>Suillus grevillei</i> | Goldgelber Lärchen-Röhrling | essbar | bei Lâ auf Nadelstreu |
| 93. <i>Tapinella atrotomentosa</i> | Samtfusksrempling | ungeniessbar | an Fi-Stumpf |
| 94. <i>Thelephora palmata</i> | Stinkender Warzenpilz | ungeniessbar | bei Fi auf Nadelstreu |
| 95. <i>Trametes hirsuta</i> | Striegelige Tramete | ungeniessbar | an Buchenast |
| 96. <i>Trametes pubescens</i> | Samtige Tramete | ungeniessbar | an Eschenast |
| 97. <i>Tremella foliacea</i> | Rotbrauner Zitterling | ungeniessbar | an Buchenast |
| 98. <i>Trichaptum abietinum</i> | Violetter Lederporling | ungeniessbar | an Fi-Stamm |
| 99. <i>Tricholomopsis rutilans</i> | Purpurfilziger Holzritterling | ungeniessbar | an morschem Fi-Stumpf |
| 100. <i>Tylopilus felleus</i> | Gallen-Röhrling | ungeniessbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu |
| 101. <i>Xerocomus badius</i> | Maronen-Röhrling | essbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu |
| 102. <i>Xerocomus chrysenteron</i> | Rotfuss-Röhrling | essbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu |
| 103. <i>Xerocomus pruinatus</i> | Bereifter Rotfuss-Röhrling | essbar | bei Fi im Moos, Nadelstreu |
| 104. <i>Xerocomus subtomentosus</i> | Ziegenlippe | essbar | bei Fi, Bi auf Nadelstreu |
| 105. <i>Xeromphalina campanella</i> | Geselliger Glöckchennabeling | ungeniessbar | an bemoostem Fi-Stumpf |
| 106. <i>Xerula radicata</i> | Schleimiger Wurzelrübling | essbar | an Fichtenstumpf |
| 107. <i>Xylaria longipes</i> | Langstielige Ahorn-Holzkeule | ungeniessbar | an morschem Laubholzast |