

By / Obb / Oberschleißheim / westl. Teil vom Berglholz / VfP-Wanderung

Grasiger Kiefern-Mischwald, mit Eichen, Linden, auch einzelne Hainbuchen. Untermischt mit Buchen- und Fichtengruppen, östl. auch reiner Fichtenwald mit Kiefern untermischt.

1. *Amanita phalloides* (Fr. 1821) Link 1833
2. *Amylostereum areolatum* (Chaillet : Fr. 1828) Boidin 1958
3. *Armillaria mellea* (Vahl 1790 : Fr. 1821) Kummer 1871 Agg.
4. *Bjerkandera adusta* (Willdenow 1787 : Fr. 1821) Karsten 1879
5. *Boletus edulis* Buillard 1781 : Fr. 1821
6. *Clavulina coralloides* (L. 1753 : Fr. 1821) Schroeter 1888
7. *Clitocybe geotropa* (DeCandolle et Lamarck 1805) Quelet 1872
8. *Clitopilus prunulus* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Kummer 1871
9. *Cortinarius anomalus* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838
10. *Cortinarius infractus* (Pers. : Fr. 1821) Fr. 1838
11. *Cortinarius odorifer* Britzelmayer 1885
12. *Cortinarius praestans* (Cordier 1870) Gillet 1878
13. *Cortinarius splendens* var *meinhardii*
14. *Cortinarius varius* (Schaeffer 1774 : Fr. 1821) Fr. 1838
15. *Cystoderma carcharias* (Pers. 1801) Fayod 1889
16. *Fistulina hepatica* (Schaeffer 1774 : Fr. 1821) Withering 1792 an leb. Ei.
17. *Fomitopsis pinicola* (Swartz 1810 : Fr. 1821) Karsten 1881
18. *Galerina marginata* (Batsch 1789) Kühner 1935 an Fi.
19. *Ganoderma lipsiense* (Batsch 1786 : Pers. 1801) Atkinson 1908
20. *Gloeophyllum odoratum* (Wulfen 1788 : Fr. 1821) Imazeki 1943 an Fi-Sta
21. *Gymnopus confluens* (Pers. 1796 : Fr. 1821) Antonin , Halling et Noord. 1997
22. *Hebeloma senescens* (Batsch 1789) Saccardo 1887
23. *Hebeloma sinapizans* (Paulet 1808 : Fr. 1838) Gillet 1874 bei Bu.
24. *Hypholoma fasciculare* (Hudson 1778 : Fr. 1821) Kummer 1871
25. *Hypholoma lateritium* (Schaeffer : Fr.) Schroeter
26. *Inocybe geophylla* (Sowerby 1799 : Fr. 1821) Kummer 1871
27. *Laccaria amethystina* (Hudson 1778) Cooke 1884
28. *Laccaria laccata* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Cooke 1884 Aggregat
29. *Lactarius deterrimus* Gröger 1968
30. *Lactarius scrobiculatus* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Fr. 1838
31. *Lepiota cristata* (Bolton 1788 : Fr. 1821) Kumm 1871
32. *Lepista flaccida* (Sowerby 1799 : Fr. 1821) Patouillard 1887
33. *Lepista irina* (Fr. 1838) Bigelow 1959
34. *Lepista nuda* (Fr. : Fr. 1821) Cooke 1871
35. *Lepista sordida* (Schumacher : Fr. 1821) Singer 1951
36. *Lycoperdon perlatum* Pers. 1796 : Pers. 1801
37. *Lycoperdon pyriforme* Schaeffer 1774 : Pers. 1801 an Stü.
38. *Merulius tremellosus* Schrader 1774 : Fr. 1821
39. *Mycena zephirus* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Kummer 1871
40. *Pluteus atromarginatus* (Singer 1925) Kühner 1935

41. *Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bulliard 1792 : Fr. 1821) Singer 1956
42. *Rhodocollybia butyracea* var. *asema* (Bulliard 1791 : Fr. 1821) Lennox 1979
43. *Rhytisma acerinum* (Pers.: Fr. ) Fr. An BergAhorn
44. *Rickenella fibula* (Buillard 1783 : Fr. 1821) Raithelhuber 1973
45. *Skeletocutis amorpha* (Fr.1815 : Fr.1821) Kotlaba et Pouzar 1958
46. *Spongiporus caesius* (Schrader 1794 : Fr. 1821) David 1980 an Fi-Ast
47. *Trametes gibbosa* (Pers. 1795 : Fr. 1821) Fr. 1838
48. *Trametes hirsuta* (Wulfen 1788 : Fr. 1821) Pilat 1939
49. *Trametes versicolor* (L. 1753 : Fr. 1821) Pilat 1936 an Stu?
50. *Trichaptum hollii* (Schmid : Fr. ) Kreisel an Ki-Ast
51. *Tricholomopsis rutilans* (Schaeffer 1774 : Fr. 1821) Singer 1939
52. *Xerocomus badius* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Kühner ex Gilbert 1931
53. *Xerula radicata* (Relhan 1785 : Fr. 1821) Dörfelt 1975
54. *Xylaria polymorpha* (Pers.1797 : Fr. 1823) Greville 1823

*Cortinarius cf. allutus* bei Fi.

*Cortinarius cf. napus*

*Hygrophorus cf. piceae* bei Fi