

MAMU-Wanderung 13.10.19 Seefelder Schlosspark

Hypholoma fasciculare(Gelbblättriger Schwefelkopf)
Inocybe fibrosa(Weißer/Eingeknickter Rißpilz), unter Fichte, auf Kalk
Cortinarius elegantior(Strohgelber Klumpfuß), unter Fichte, auf Kalk
Cortinarius infractus(Bitterer Schleimkopf)
Cortinarius meinhardii(Dottergelber Klumpfuß), unter Fichte
Cortinarius mussivus(Stinkender Schleimkopf)
Cortinarius odorifer(Anis-Klumpfuß), unter Fichte, auf Kalk
Cortinarius olidus(Gelbgürtelter Schleimkopf)
Cortinarius platypus(Flachknölliger Klumpfuß)
Cortinarius praestans(Schleiereule)
Cortinarius violaceomaculatus(Gelbbrauner Schleimkopf), unter Fichte, auf Kalk
Gymnopilus penetrans(Geflecktblättriger Flämmling)
Pholiota jahnii/muelleri(Pinselschüppling)
Hebeloma sinapizans(Großer Rettich-Fäibling) vom Hutfleisch reicht ein kegelförmiger Zapfen in den Stiel, in Hexenringen unter Buchen, auf Kalk
Hebeloma circinans(Elfenring-Fäibling)
Agaricus sylvaticus(Kleinsporiger Waldchampignon/Kleiner Blutegerling), unter Fichte
Lepiota cristata(Stinkschirmling)
Entoloma excentricum(Exzentrischer/Marmorierter Rötling)
Entoloma nitidum(Stahlblauer Rötling)saurer Nadel,-oder Mischwald
Rhodophana/Rhodocybe nitellina(Gelbfuchsiger Tellerling)
Gymnopus confluens(Knopfstieliger Rübling)
Rhodocollybia butyracea(Butter-Rübling)
Flammulina velutipes(Samtfußrübling)
Armillaria ostoyae(Dunkler Hallimasch), an Fichte
Armillaria aggr. unter Buchen, Hainbuchen
Mycena galopus(Weißmilchender Helmling)
Mycena pura((Gemeiner Rettich-Helmling)
Mycena rosea(Rosa Rettich-Helmling)
Marasmius wynneae/wynnei(Violettlicher Schwindling)
Pseudoclitocybe cyathiformis(Kaffeebrauner Gabeltrichterling)
Clitocybe phaeophtalma(Ranziger Trichterling), hat eine bitter schmeckende Huthaut
Infundibulocybe geotropa(Mönchskopf)
Tricholoma pardalotum/tigrinum/pardinum(Tiger-Ritterling)
Tricholoma terreum(Gemeiner Erdritterling)
Tricholoma vaccinum(Bärtiger Ritterling), unter Fichte
Lepista glaucocana(Blassblauer Rötelritterling)
Lepista irina(Veilchen-Rötelritterling)
Lepista nuda(Violetter Rötelritterling)
Lepista sordida(Schmutziger Rötelritterling)
Clitocybe nebularis(Nebelgrauer Röteltrichterling/Nebelkappe)

Laccaria amethystina(Violetter Lacktrichterling)
Leucocortinarius bulbiger(Knolliger Schleierritterling), unter Fichte, auf Kalk
Coprinopsis picacea(Specht-Tintling)
Auricularia auricula-judae(Judasohr)
Russula integra(Brauner Ledertäubling), im Bergnadelwald, unter Fichte,
Russula mairei var. *mairei*(BuchenSpeitäubling)
Russula viscida(Lederstiel-Täubling)
Lactarius deterrimus(Fichtenreizker)
Lactarius aurantiacus(Milder Orangemilchling), unter Fichte
Lactarius scrobiculatus(Grubiger Milchling), unter Fichte
Clavariadelphus pistillaris(Herkuleskeule), im Buchenwald, auf Kalk
Craterellus/Cantharellus tubaeformis(Trompetenpifferling)
Clavulina coralloides(Kammkoralle)
Clavulina cinerea(Graue Koralle)
Hydnus repandum((Semmel-Stoppelpilz)
Lycoperdon perlatum(Flaschenstäubling)
Apioperdon/Lycoperdon pyriforme(Birnenstäubling), an totem Holz
Geastrum fimbriatum(Gewimperter Erdstern), unter Fichte
Plicaturopsis crispa(Buchen-Adernzähling)
Schizophyllum commune(Gemeiner Spaltblättling)
Trametes versicolor(Schmetterlingstramete)
Fomes fomentarius(Zunderschwamm)
Suillus/Boletinus cavipes(Hohlfuß-Röhrling), unter Lärche
Suillus grevillei(Goldgelber Lärchenröhrling)
Suillus tridentinus(Rostroter Lärchenröhrling)
Helvella crispa(Herbstlorchel)
Gyromitra infula(Bischofsmütze), an Fichtenstumpf
Nectria cinnabarina(Zinnoberroter Pustelpilz)
Xylaria hypoxylon(Geweihförmige Holzkeule)