

Tabelle1

Fundliste Gleißental Vereinswanderung 26.08.2023

Rev02, 29.08.2023, Johann Rejek

In der Nacht davor hat es ausgiebig geregnet, die Tage davor schwülheiß und kein Niederschlag.

Anmerkungen

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Braunfilziger Amyloidschichtpilz | <i>Amylostereum areolatum</i> | an Fichtenstumpf |
| Hallimasch spec | <i>Armillaria spec</i> | |
| Ohrlöffelstacheling | <i>Auriscalpium vulgare</i> | |
| Klebriger Hörnling | <i>Calocera viscosa</i> | |
| Hollundercercospora | <i>Cercospora depazeoides</i> | an Sambucus nigra-Schwarzer Holler, im Dorf |
| Ockerbrauner Trichterling | <i>Clitocybe Gibba</i> | jung mit fühlbarem Buckel |
| Grüner Anis-Trichterling | <i>Clitocybe odora</i> | |
| Bitterlicher Trichterling | <i>Clitocybe phaeophthalma</i> | blasige Huthautstruktur |
| Kiefernadel-Huflattich-Wechselrost | <i>Coleosporium tussilaginis</i> | an Tussilago farfara-Huflattich |
| Puppenkernkeule | <i>Cordyceps cf. Militaris</i> | |
| Rosa Rindenpilz | <i>Cortitium roseum</i> | an Salweidenstamm |
| Herbst-Trompete / Toten-Trompete | <i>Craterellus cornucopioides</i> | |
| Stummelfüßchen spec. | <i>Crepidotus spec</i> | |
| Schwarzblauer Röhrling | <i>Cyanoboletus pulverulentus</i> | |
| Gestreifter Teuerling | <i>Cyathus striatus</i> | |
| Rötende Tramete | <i>Daedaleopsis confragosa</i> | |
| Amerikanischer Echter Eichenmehltau | <i>Erysiphe alphitoides</i> | an Stieleiche |
| Echter Hainbuchenmehltau | <i>Erysiphe arcuata</i> | im Dorf |
| Echter Europäischer Pfaffenhütchenmehltau | <i>Erysiphe euonymi</i> | |
| Echter Weinmehltau | <i>Erysiphe necator</i> | an Vitis vinifera-Echte Weinrebe, im Dorf |
| Birkenporling | <i>Fomitopsis betulina</i> | |
| Halskrausen Erdstern | <i>Geastrum triplex</i> | Schnittbild im noch zwiebförmigem Zustand |
| Zaunblättling | <i>Gloeophyllum sepiarium</i> | an Fichtenstamm |
| Echter Mehltau | <i>Golovinomyces montagnei</i> | hier an Cirsium vulgare-Lanzettkratzdistel, im Dorf |
| Echter Breitwegerichmehltau | <i>Golovinomyces sordidus</i> | an Plantago major-Breitwegerich |
| Striegeliger Rübling | <i>Gymnopus (Collibia) hariolorum</i> | Kohlgeruch |
| Knopfstieler Rübling | <i>Gymnopus confluens</i> | feinsamtiger Stiel, Hut abpflückbar > Knopfstiel |
| Nadel-Scheinhelmling | <i>Hemimycena graciles</i> | hat Hias mitgenommen, muss noch mikrosk. |
| Wurzelschwamm | <i>Heterobasidion parviporum</i> | an Fichtenstumpf |
| Braunschneidiger Wasserfuß | <i>Hydropus marginellus</i> | hat Hias mitgenommen, RL 2 |
| Falscher Pfifferling | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> | |
| Bergahornrindenschuppenborstenscheibe | <i>Hymenochaete carpatica</i> | |
| Wurzelnder Schleimrübling | <i>Hymenopollis radicata</i> | |
| Zwerg-Schwefelkopf | <i>Hypholoma subviride</i> | die Zwergenform des Grünblättr. Schwefelkopfes |
| Rotbraune Kohlenbeere | <i>Hypoxylon fuscum</i> | an Haselstamm |
| Risspilz spec. | <i>Inocybe spec.</i> | |
| Lacktrichterling | <i>Laccaria</i> | |
| Haselmilchling | <i>Lactarius pyrogalus</i> | |
| Schwefelporling | <i>Laetiporus sulphureus</i> | an Laubholzstumpf |
| Spitzschuppiger Stachelschirmling | <i>Lepiota (Echinoderma) aspera</i> | |
| Braunberingter Schirmling | <i>Lepiota ignivolva</i> | |
| Nadel-Stinkschwindling | <i>Marasmiellus perforans</i> | kein Kollar |
| Feldschwindling | <i>Marasmius oreades</i> | Grünstreifen am Bahnhof |
| Halsbandschwindling | <i>Marasmius rotula</i> | Kollar |
| Ledergelber (Filzstieler) Schwindling | <i>Marasmius torquescens</i> | bereifter Stiel |
| Käsepilzchen / Nadelstreu-Käsepilzchen | <i>Marasmius wettsteinii</i> | |

Tabelle1

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Breitblattrübling | Megacollybia plathyphylla | |
| Rosablättriger Helmling | Mycena galericulata | |
| Purpurschneidiger Blut-Helmling | Mycena sanguinolenta | |
| Hainbuchenzystidenrindenpilz | Peniophora laeta | an Hainbuchenast |
| Eschenzystidenrindenpilz | Peniophora limitata | an Eschenast |
| Safranroter Schüppling | Pholiota astragalina | leider nur ein Exemplar |
| Echter Mehltau der Hasel | Phyllactinia guttata | im Dorf |
| Lungenseitling | Pleurotus pulmonarius | an Vogelbeerstamm |
| Schwarzschnidiger Dachpilz | Pluteus atromarginatus | an Fichtenstumpf |
| Dachpilz spec | Pluteus spec | der Hut war schon recht abgefressen |
| Löwengelber Stielporling | Polyporus leptocephalus | Stielbasis schwarz |
| Sklerotienstielporling | Polyporus tuberaster | an Laubholzstamm |
| Huflattich-Rispengras-Wechselrost | Puccinia poarum | an Tussilago farfara-Huflattich |
| Gelbfuchsiger („Eichhörnchen-“)Tellerling | Rhodophana (Rhodocybe) nitellina | |
| Ahornrunzelschorf | Rhytisma acerina | an Berg- und Spitzahorn |
| Verfärbender Porenschwamm | Rigidiporus sanguinolentus | Werner Foto, im Schnitt rot verfärbend |
| Echter Mehltau des Bergahorns | Sawadaea bicornis | im Dorf |
| Echter Mehltau des Spitzahorns | Sawadaea tulasnei | im Dorf |
| Gierschseptoria | Septoria aegopodii | an Aogopodium podagraria-Giersch |
| Weißer Knorpelporling | Skeletocutis nivea Agg | an Haselast |
| Samtiger Schichtpilz | Stereum subtomentosum | an Haselstamm |
| Fichten-Traubenkirschen-Wechselrost | Thekopsora areolata | an Fichtenzapfen |
| Schmetterlingstramete | Trametes versicolor | an Laubholzast |
| Maisbeulenbrand | Ustilago maydis | |
| Geselliger Glöckchennabeling | Xeromphalina campanella | |
| Langstielige Ahorn-Holzkeule | Xylaria longipes | |
| Astschwindling | | hat Thomas mitgenommen |
| (Halbkugeliger Borstling) | (Humaria hemispaerica) | eher unwahrscheinlich, war ein anderer nicht bestimmter Becherling |